



2020년 대비


임상의학
종합평가
720^제

정·오·집

1권

페이지	분류	위치	수정 전	수정 후
83	삭제	감별진단	4) ~ 또한 본 증례의 환자는 스텐트삽입술이 아닌 관상동맥우회수술을 받았다.	4) ~ <삭제> (관상동맥개통술을 받았을 뿐 관상동맥우회수술을 받은 것이 아님)
223	오타	문제풀이	오른쪽 폐의 호흡음이	오른쪽 폐의 호흡음이
286	오타	감별진단	2) ~ 문맥압 상승을 정맥혈이 역류하여	2) ~ 문맥압 상승으로 정맥혈이 역류하여
299	오타	문제풀이	• ~ 복벽강직이 발생하였으므로	• ~ 복벽강직이 발생하였으므로
431	오류	심화학습	(2) 원인 ③ Increased loss Fanconi' syndrome, (중략) Liddle' syndrome	(2) 원인 ③ Increased loss Fanconi's(혹은 Fanconi) syndrome, (중략) Liddle's(혹은 Liddle) syndrome
436	정정	문제	문제 6번	<신장 파트 문제가 아니라 간-만성간염 파트 문제입니다.>
449	추가	심화학습		제목으로 “미세변화신증(Minimal Change Disease, MCD)” 추가
451	정정	문제	문제 14번	<신장 파트 문제가 아니라 심장-고혈압 파트 문제입니다.>
489	추가	심화학습	(3) 적응증	(3) 제석술 적응증
520	정정	문제	문제 11번	<쓰쓰가무시 문제이므로 스피로헥타병 파트가 아닌, 리케차 파트에 해당합니다.>
538	오답	정답	④	⑥
595	오류	심화학습	(3) 진단 ③ ~ plasma cortisol $\geq 5\mu\text{g/dL}$	(3) 진단 ③ ~ plasma cortisol $\geq 5\text{nmol/dL}(1.8\mu\text{g/dL})$
597	오류	심화학습	(6) 치료 ① Aldosterone	<서체문제>
805	오타	심화학습	(1) 빠른비음 증후군 ① 조기 빠른비음 증후군 • 치료 : ~ 단백질과 지방이 음식이 많은 음식으로 ~	(1) 빠른비음 증후군 ① 조기 빠른비음 증후군 • 치료 : ~ 단백질과 지방이 음식으로 많은 음식으로 ~
	오류		② 후기 빠른비음 증후군 • 치료 : ~ acarbose(GLP1 agonist 당뇨 치료제로도 쓰임)	② 후기 빠른비음 증후군 • 치료 : ~ acarbose(alpha glucosidase inhibitor 당뇨 치료제로도 쓰임)

 2권

페이지	분류	위치	수정 전	수정 후
20	오류	문제분석	영상 니트라진 검사: 음성 ~	영상 니트라진 검사: 양성 ~
28	오타	심화학습	태반조기박료 의 치료	태반조기박리의 치료
41	오류	감별진단	4) 메토크세이트: ~ β -hCG의 level이 5,000 이상으로 높으며 , ~	4) 메토크세이트: ~ β -hCG의 level이 5,000 이하로 낮으며 , ~
42	삭제	심화학습	(3) β -hCG ② ~ 그 후에는 3.5일, 48시간 이내)	(3) β -hCG ② ~ 그 후에는 3.5일< 삭제 >
50	오류	심화학습	Preeclampsia(전자간증) (3) 다음 조건들을 모두 만족	Preeclampsia(전자간증) (3) 다음 조건 중 하나 이상을 만족
52	오타	심화학습	전자간증(preeclampsia) 전자간증은 “ regnancy-specific ~	전자간증(preeclampsia) 전자간증은 “ pregnancy-specific ~
65	오류	꿀!팁! check	(1) 조기태반박리 <전치태반 내용> (2) 전치태반 <조기태반박리 내용>	조기태반박리와 전치태반이 제목이 바뀌어 있음 (1) 전치태반 ① 통증 x + 질출혈 ② 치료 • Preterm시 분만연장과 대기치료 • Near term이나 태아사망시 C/S • Severe homorrhage시 임신 주수와 상관없이 응급 C/S (2) 조기태반박리 ① 통증 o + 질출혈 ② 치료 • 초음파 검사 시행후 출혈이 멈추고 태아와 산모 상태 양호시 close monitoring • Fetal distress시 C-sec • 태아 사망시 V/D(산모 혈액학적 불안정시 C/S)
98	오타	심화학습	터너증후군(Turner syndrome) (1) 증상 ① Ovary 기능의 저하 ~ • 유방발 달 저하 : 2차 성징 없음	터너증후군(Turner syndrome) (1) 증상 ① Ovary 기능의 저하 ~ • 유방 발달 저하 : 2차 성징 없음
143	오타	심화학습	(2) 안드로겐 무감응 ③ 증상의 정리 • Asynchronous puberty- Beast 는 발달	(2) 안드로겐 무감응 ③ 증상의 정리 • Asynchronous puberty- Breast 는 발달
180	오류	문제분석	영상 USG: cyst, diameter 6cm	영상 USG: cyst, diameter 5cm
232	오타	감별진단	• 엡스타인-바 바이러스 ~	• 엡스타인-바 바이러스 ~
237	오류		염증성 설사(Inflammatory diarrhea)	비염증성 설사(Non-inflammatory diarrhea)
292	추가	심화학습	(2) * 무산소 발작 ~ 체혈관 저항 ↓ 전신 정맥 순환	(2) * 무산소 발작 체혈관 저항 ↓ → 전신 정맥 순환
294	정정	문제	문제 35번	<소아과 문제가 아니라 소화기 내과 파트 문제입니다.>



페이지	분류	위치	수정 전	수정 후
306	오류	심화학습	(1) 개념 ① 성인의 보통 신증후군 기준 • 신증후군 범위 단백뇨(>3.5g/day) • 소아신증후군에서는 $\geq 40\text{mg}/\text{시간}/\text{m}^2$ (960mg/m ² /일) • 소아의 단백뇨 기준: 4~40mg/m ² /시간 ② 저알부민혈증(<2.5g/dL) ③ 염분과 수분 저류(=부종) ④ 고지질혈증(공복시 > 200mg/dL)	(1) 개념 성인의 신증후군 기준 ① 신증후군 범위 단백뇨(>3.5g/day) 소아에서는 $\geq 40\text{mg}/\text{m}^2/\text{시간}$ (960mg/m ² /일) ② 저알부민혈증(<2.5g/dL) ③ 염분과 수분 저류(=부종) ④ 고지질혈증(공복시 > 200mg/dL)
424	추가	심화학습		제목으로 “벤조디아제핀(Benzodiazepine)” 추가
466	오타	문제풀이	• ~ 수상 직후 의식이 명확한 또한 경막외출혈에서 나타날 수 있는 현상이다.	• ~ 수상 직후 의식이 명확한 것 또한 경막외출혈에서 나타날 수 있는 현상이다.
581	오타	임상표현형 및 문제의도	• ~ 전염병의 관리에 대한방법을 묻는 문제이다.	• ~ 전염병의 관리에 대한 방법을 묻는 문제이다.
594	오류	문제풀이	• ~ 해열제와 항구토제 보다는 기저 원인 에 맞는 치료를 우선 생각해야 한다.	• ~ 해열제와 항구토제 보다는 열탈진 에 맞는 치료를 우선 생각해야 한다.
623	추가	문제풀이	<해설 추가>	사회인지이론의 핵심은 사회적 관계입니다. 03번 문제에서는 또래끼리 노는 모습이 또래에게 영향을 주고 있으며, 04번 문제에서는 참여자들끼리 토론 및 비슷한 환자의 경험담으로 참여자들이 영향 받고 있습니다.
625				
648	삭제	문제풀이	• ~ 그 다음에 치러지는 이 법에 따른 국가시험 등의 응시를 3회의 범위에서 제한할 수 있다.	• ~ 그 다음에 치러지는 <삭제> 국가시험 등의 응시를 3회의 범위에서 제한할 수 있다.