

2023 대비 KNLE 합격예감 모의고사 정오표

☞ 1권 1회 2교시 아동간호학 p.40

⇒ 3) → 2)

27 혈우병으로 진단된 학령전기 아동의 간호로 옳지 않은 것은?

- 1) 출혈 예방 및 내출혈 증상에 대해 교육한다
- 2) 관절통 호소시 아스피린을 투여한다
- 3) 출혈이 의심될 때 해당 응고인자를 투여한다
- 4) 구강출혈 예방을 위해 스펀지로 된 칫솔을 사용한다
- 5) 근육 주사 또는 정맥천자를 금지한다

27 정답 3)

혈우병

혈액응고인자의 결핍으로 인해 발생하는 일련의 지혈장애로, 유전성 출혈 질환군에 해당한다.

- 간호 중재
 - 출혈 예방 및 내출혈 증상에 대해 교육한다(내출혈 증상 : 두통, 느껴지는 말투, 검고 타르같은 대변).
 - 상해 위험 감소를 위해 수용과 같은 비접촉성 운동을 권장한다.
 - 구강출혈 예방을 위해 물 세척 도구, 스펀지로 된 칫솔을 사용한다.
 - 혈소판 기능을 억제시킬 수 있기 때문에 아스피린 사용을 금지한다(→ 타이레놀 사용).

27 혈우병으로 진단된 학령전기 아동의 간호로 옳지 않은 것은?

- 1) 출혈 예방 및 내출혈 증상에 대해 교육한다
- 2) 관절통 호소시 아스피린을 투여한다
- 3) 출혈이 의심될 때 해당 응고인자를 투여한다
- 4) 구강출혈 예방을 위해 스펀지로 된 칫솔을 사용한다
- 5) 근육 주사 또는 정맥천자를 금지한다

27 정답 2)

혈우병

혈액응고인자의 결핍으로 인해 발생하는 일련의 지혈장애로, 유전성 출혈 질환군에 해당한다.

- 간호 중재
 - 출혈 예방 및 내출혈 증상에 대해 교육한다(내출혈 증상 : 두통, 느껴지는 말투, 검고 타르같은 대변).
 - 상해 위험 감소를 위해 수용과 같은 비접촉성 운동을 권장한다.
 - 구강출혈 예방을 위해 물 세척 도구, 스펀지로 된 칫솔을 사용한다.
 - 혈소판 기능을 억제시킬 수 있기 때문에 아스피린 사용을 금지한다(→ 타이레놀 사용).