

2018대비 아동간호학 요약집 1차 정오표

페이지	p.101
수정전	<p>(2) 종류 : 여러 가지 다른 기형이 동반됨</p> <p>① 1차공 결손(ASD1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 가장 흔한 결손 • 중격의 하부 끝에 결손이 생긴 것 • 특별한 치료를 필요로 하지 않음 <p>② 2차공 결손(ASD2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심방중격의 중앙부인 2차공에 결손이 위치하는 경우 • 아동기에 심부전을 일으키는 경우는 드물며 성인이 되어 주로 폐동맥 고혈압이 생긴 후 심부전이 나타남 • 치료 및 간호 : 개심술로 결손 교정함(2~3세경에 수술)
수정후	<p>(2) 종류 : 여러 가지 다른 기형이 동반됨</p> <p>① 1차공 결손(ASD1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 중격의 하부 끝에 결손이 생긴 것 • 특별한 치료를 필요로 하지 않음 <p>② 2차공 결손(ASD2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 가장 흔한 결손 • 심방중격의 중앙부인 2차공에 결손이 위치하는 경우 • 아동기에 심부전을 일으키는 경우는 드물며 성인이 되어 주로 폐동맥 고혈압이 생긴 후 심부전이 나타남 • 치료 및 간호 : 개심술로 결손 교정함(2~3세경에 수술)