



2018년 대비

임상의학  
종합평가  
720<sup>제</sup>

정·오·집

1권

페이지	분류	위치	수정 전	수정 후
279	오류	심화학습	<전체>	<모두 삭제>

2권

페이지	분류	위치	수정 전	수정 후
484	오류	문제풀이	<ul style="list-style-type: none"> <li>식사 도중 목을 ~ 기침을 하도록 격려하기이다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>이물에 의한 기도폐쇄가 의심되는 환자이다. 청색증을 보이긴 하지만 의식이 있고 질문에 선 목소리로 대답을 하고 있는 것으로 보아 가벼운 기도폐쇄로 판단된다. 가벼운 기도폐쇄에서는 환자의 자발적인 기침과 숨 쉬기 위한 노력을 방해하지 않아야 한다. 따라서 스스로 기침을 하도록 격려하는 것이 적절한 응급처치이다.</li> </ul>
	추가	감별진단		1), 4) 심각한 기도폐쇄의 징후(말을 하지 못함, 기침할 때 소리가 나지 않음, 숨을 쉴 수 없음, 청색증, 의식 감소)를 보이는 성인이나, 1세 이상의 소아는 의식 유무와 관계 없이 즉시 119에 연락 후 기도폐쇄의 징후가 해소되거나 환자가 의식을 잃기 전까지 복부밀어내기(하임리히법)를 반복한다. 만약 질문에 대답을 하지 못하고 고개를 끄덕인다면 심각한 상태의 기도폐쇄로 판단해야 한다.
514	오류	심화학습	③ 대개 정규분포 곡선	③ 대개 대수정규분포 곡선